










4) 果樹

(備考の表2は、作物別施肥基準の利用にあたっての留意点で示されている表－2をさす)

作物名	作 型 その他	品 種 名	栽植 様式 (本/10a)	作 型 模 式 図												目標 収量 (kg)	要素	基肥 (kg) ①	追肥(kg)		要素 合 計	備考
				1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月				②	③		
リンゴ (普通栽培)	幼木 (4～5年)	つがる 陽光 ふじ	3 0														N P ₂ O ₅ K ₂ O	4 2 3	1		5 2 3	・ C G 55、57台木の場合は普通栽培に準ずる。 ・ 品種、地力により施肥量を適宜加減する。
	未成木 (7～8年)		3 0													1,500 ～ 2,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	6 4 6	2		8 4 6	
	成木 (12年以上)		1 5													3,000 ～ 3,500	N P ₂ O ₅ K ₂ O	12 8 12	3		15 8 12	
リンゴ (わい化栽培)	幼木 (4～5年)	つがる あかぎ 陽光 ふじ	高密植 並木植 100～130														N P ₂ O ₅ K ₂ O	4 3 3	1		5 3 3	・ 追肥の窒素は速効性の単肥(尿素等)が好ましい。 ・ 品種、地力により施肥量を適宜加減する。
	準成木 (5～6年)		100～130														N P ₂ O ₅ K ₂ O	7 5 5	3		10 5 5	
	成木		100～130													2,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	7 5 5	3		10 5 5	
ナシ	幼木 (5年以上)	幸水	3 3														N P ₂ O ₅ K ₂ O	3 2 3	1 0.5 1	1 0.5 1	5 3 5	・ 他品種の窒素施肥量(成木) 二十世紀 15kg 豊水 22kg ・ 火山灰土壌ではリン酸の施肥量を20%程度増加する。 ・ 牛ふんたい肥2 t /10a施用する。 この時は表2により減肥量を基肥から差し引く。
	未成木 (7～10年)		3 3													1,500	N P ₂ O ₅ K ₂ O	5 8 5	2 2 2	3 3 3	10 8 10	
	成木 (12年以上)		2 0													3,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	12 18 9	4 2 2	6 7 7	22 18 18	
モモ	幼木 (2～3年)	白鳳	3 3														N P ₂ O ₅ K ₂ O	2 2 2	1 1 1		3 2 3	・ 樹勢が強い場合は、施肥量を削減する。 ・ 牛ふんたい肥2 t /10a施用する。 この時は表2により減肥量を基肥から差し引く。
	未成木 (5～6年)		3 3													800	N P ₂ O ₅ K ₂ O	6 8 6	3 3 3		9 8 9	
	成木 (8～10年)		3 3													2,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	8 10 8	4 4 4		12 10 12	
	成木 (10年以上)		2 0													2,600 ～ 3,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	10 12 10	5 5 5		15 12 15	

作物名	作 型 その他	品 種 名	栽植 様式 (本/10a)	作 型 模 式 図												目標 収量 (kg)	要素	基肥 (kg) ①	追肥(kg)		要素 合 計	備考
				1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月				②	③		
ウメ	幼木 (2～3年)	白加賀	4 0														N P ₂ O ₅ K ₂ O	3 4 3	1 1 1	1 1 1	5 4 5	・ 着果状況と樹勢に応じて、施肥量を加減する。 ・ 南高など完熟まで収穫を遅らせた樹では、7月の追肥③を2～3kg/10a増肥する。 ・ 牛たい肥2 t /10a施用する。 この時は表2により減肥量を基肥から差し引く。
	未成木 (5～7年)		4 0													500	N P ₂ O ₅ K ₂ O	6 8 6	2 2 2	2 2 2	10 8 10	
	成木 (8～10年)		2 0 ～ 3 0													800	N P ₂ O ₅ K ₂ O	10 15 10	3 3 3	5 5 5	18 15 18	
	成木 (10年以上)		2 0													1,500 ～ 1,800	N P ₂ O ₅ K ₂ O	11 16 11	3 3 3	6 6 6	20 16 20	
スモモ	幼木 (2～4年)	サンタローザ ソルダム 太陽	3 3														N P ₂ O ₅ K ₂ O	2 3 1.5	1 0.5		3 3 2	・ 着果量と樹勢に応じて施肥量を加減する。 ・ 牛ふんたい肥2 t /10a施用する。 この時は表2により減肥量を基肥から差し引く。
	未成木 (5～7年)		2 5													500	N P ₂ O ₅ K ₂ O	4 4 3	2 2		6 4 5	
	成木 (8～10年)		1 8													1,500	N P ₂ O ₅ K ₂ O	8 6 6	3 3		11 6 9	
	成木 (10年以上)		1 8													2,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	10 10 9	4 3		14 10 12	
カキ	幼木 (2～3年)	松本早生富有 富有	3 0														N P ₂ O ₅ K ₂ O	2 3 2	1 1 1	1 1 1	4 3 4	・ 土壌条件、樹勢に応じて窒素の量を加減する。 ・ 牛ふんたい肥2 t /10a施用する。 この時は表2により減肥量を基肥から差し引く。
	未成木 (7～8年)		20～30													1,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	8 8 8	2 2		10 8 10	
	成木 (12年以上)		20～30													2,000 ～ 2,500	N P ₂ O ₅ K ₂ O	14 16 12	4 4		18 16 16	
クリ	幼木 (2～3年)	丹波 筑波	4 8														N P ₂ O ₅ K ₂ O	3 5 3	1 1 1	1 1 1	5 5 5	・ 牛ふんたい肥2 t /10a施用する。 この時は表2により減肥量を基肥から差し引く。
	未成木 (6～7年)		3 3														N P ₂ O ₅ K ₂ O	4 8 4	2 2 2	2 2 2	8 8 8	

作物名	作 型 その他	品 種 名	栽植 様式 (本/10a)	作 型 模 式 図												目標 収量 (kg)	要素	基肥 (kg) ①	追肥(kg)		要素 合 計	備考
				1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月				②	③		
クリ	成木 (12年以上)	丹波 筑波	1 2													300	N P ₂ O ₅ K ₂ O	8 16 8	4 4	4 4	16 16 16	・牛ふんたい肥2 t /10a施用する。 この時は表2により減肥量を基肥 から差し引く。
ブドウ	幼木 (2～4年)	デラウェア	2 0														N P ₂ O ₅ K ₂ O	2 4 2			2 4 2	・リン酸は全量基肥とする。 ・追肥は結実状況、樹勢等を判断し て6月の落花直後にカリを玉肥と して施用する。
	未成木 (5～7年)		2 0													300	N P ₂ O ₅ K ₂ O	4 8 4	2 2	2 2	8 8 8	
	成木 (8年以上)		1 5													1,500	N P ₂ O ₅ K ₂ O	8 12 8	3 3	4 4	15 12 15	
	幼木 (1～3年)	巨峰	1 5														N P ₂ O ₅ K ₂ O	3 2			3 2	
	未成木 (4～7年)		1 5													300	N P ₂ O ₅ K ₂ O	2 6 3		2		2 6 5
	成木 (8年以上)		5 ～ 6													1,300	N P ₂ O ₅ K ₂ O	3 12 5		5		3 12 10
キウイ フルーツ	幼木 (2～3年)	ヘイワード	3 3													150	N P ₂ O ₅ K ₂ O	6 4 6			6 4 6	・土壌条件、樹勢、着果量に応じて 施肥量を加減する。
	未成木 (4～6年)		3 3													500 ～ 1,500	N P ₂ O ₅ K ₂ O	8 8 8	2 2		10 8 10	
	成木 (7年以上)		3 3													1,500 ～ 2,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	12 13 12	3 3		15 13 15	
ブルー ベリー	幼木 (1～3年)	おおつぶ星 あまつぶ星	3 0 0														N P ₂ O ₅ K ₂ O	2 2 2	1 1 1		3 3 3	・有機質肥料、緩効性肥料を生育状 況をみながら、施用する。 ・土壌pHが高い場合は、pH(H ₂ O)4.5 を目安に矯正する。
	未成木 (4～6年)		3 0 0													200 ～ 600	N P ₂ O ₅ K ₂ O	3 3 3	1 1 1		4 4 4	
	成 木 (7年以上)		3 0 0													600 ～ 900	N P ₂ O ₅ K ₂ O	4 4 4	2 2 2		6 6 6	

作物名	作 型 その他	品 種 名	栽植 様式 (本/10a)	作 型 模 式 図												目標 収量 (kg)	要素	基肥 (kg) ①	追肥 (kg)		要素 合 計	備考
				1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月				②	③		
オウトウ	幼木 (1～3年)	佐藤錦 ナポレオン 高砂	5 0									①					N P ₂ O ₅ K ₂ O	2 2 2			2 2 2	・ 土壌、樹勢、着果量に応じて、適正量を加減する。
	未成木 (4～6年)		5 0													100 ～ 300	N P ₂ O ₅ K ₂ O	4 3 4	2 1 2		6 4 6	
	成木 (7年以上)		3 3													500	N P ₂ O ₅ K ₂ O	8 6 8	4 2 4		12 8 12	