

5) 花き

(備考の表2は、作物別施肥基準の利用にあたっての留意点で示されている表-2をさす)

作物名	作 型 その他	品 種 名	形態	栽植 様式	作 型 模 式 図												目標 収量 (本)	要素	基肥 (kg)	追肥(kg) (回)			要素 合計	備 考
					1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月				1	2	3		
キク	7～9月 出し	サマーイエロー サマーイエロー あずみ露 松本城 岩の白扇 深志の匠	露地	2条植 条間30cm 株間 12～15cm 通路90cm			○	×	①		○	×	①				32,000 ～ 35,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	10～15 10～15 10～15	3～5 3～5			13～20 10～15 13～20	・たい肥2～3t (この時は表2 により減肥量 を、基肥から差 し引く)
	二度切り 栽培 10～12月 ・2～4月 出し	精興の誠 神馬 東部	施設	6条植 床幅75cm 条間10cm 株間15cm 通路45cm	★							☆	★	☆			37,000 ～ 39,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	20～22 10～12 12～14	3～4 3～4			22～28 8～10 10～13	・たい肥1t (同 上) ・追肥は生育に 応じて窒素、カ リを3～4kg程度 施用。
	6～9月出 し	岩の白扇	施設	6条植 床幅75cm 条間10cm 株間15cm 通路45cm		☆		★			☆	★					37,000 ～ 39,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	18～20 14～16 16～18	3～4 3～4			21～24 14～16 19～22	・たい肥1t (同上) ・追肥は生育に 応じて窒素、カ リを3～4kg程度 施用。
	シェード 7～9月出 し	イエローシューズ ニコル 風車系 サマースポット	施設	4条植 床幅100cm 条間20cm 株間15cm 通路60cm				○	×	①	遮光		○	×	①		38,000 ～ 40,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	8～10 8～10 8～10	2～3 2～3			10～13 8～10 10～13	・たい肥2～3t (同上)
バラ	夏季休眠 型	ローテローゼ ティネケ ノブレス	施設	2条植 床幅 60～65cm 条間 20～25cm 株間 25～30cm 通路 60～65cm			×							①		②	90,000 ～ 100,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	30 10 10	1～5回			50～70 20～40 20～40	・たい肥2～5t (同上) ・基肥は植付時 初年度の施用量 を示す。 ・追肥は2年目 以降の施用量を 示す。 ・生育により5 回程度に分施す る。
	冬季休眠 型	ローテローゼ ノブレス ティネケ パレオ90 フィジー トボネ	施設	2条植 床幅 60～65cm 条間 25～30cm 株間 20～25cm 通路 60～65cm				×				①			②		90,000 ～ 100,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	20 10 10	1～5回			40～60 20～40 20～40	・たい肥2～5t (同上) ・基肥は植付時 初年度の施用量 を示す。 ・追肥は2年目 以降の施用量を 示す。 ・生育により5 回程度に分施す る。

作物名	作 型 その他	品 種 名	形 態	栽植 様式	作 型 模 式 図												目 標 収 量 (本)	要素	基肥 (kg)	追肥(kg) (回)			要素 合計	備 考
					1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月				1	2	3		
スターチス	宿根性	ブルーファンタジア 100 ミスティークピンク エミール パイオニア キノブラン	施設	2 条植 条間48cm 株間40cm 通路60cm													28,000 ～ 32,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	15～20 15～20 15～20	3～4 3～4 3～4	液肥 2～3 回 適宜	18～24 20～27 18～24	・ たい肥2～3t (同上) ・ 基肥は植付時 初年度の施用量 を示す。追肥は 2年目以降の施 用量。	
スターチス	一年生	ソピア シルキーミックス パステル系	施設	2 条植 条間 30～40cm 株間 30～40cm 通路60cm													100,000 ～ 120,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	10～20 10～20 10～20				10～20 10～20 10～20	
ナルコユリ (フィリアマド コロ/ナルコラ ン)	3～4月出 し		施設	6～7条植 床幅 100～120 cm 条間15cm 株間5cm 通路 60～65cm													100,000 ～ 120,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	10 8 10	2 2 2	4 3 4	16 13 16	・ 追肥は萌芽時 と夏場に施用。	
シンテッポウユ リ	1 年目 8 ～10月出 荷・2 年 目 6～7 月出荷	北沢系（自家採取）	露地	10条植 床幅100cm 条間10cm 株間18cm 通路75cm													25,000 ～ 28,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	30～35 30～35 30～35				30～35 30～35 30～35	・ たい肥6～7t (同上)
スイセン	12～2月 出し	フォーチュン ガーデンジャイアント アイスフォーリス ピンクチャーム	施設	6～7条植 床幅 90～100cm 条間15cm 株間5cm 通路70cm													70,000 ～ 80,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	18～20 18～20 18～20				18～20 18～20 18～20	・ たい肥2t (同上)
カラー		サンライト	施設	2 条植 条間 10～15cm 株間 10～15cm 通路 30～40cm													30,000 ～ 50,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	15～20 15～20 15～20				15～20 15～20 15～20	
フリージア	1～2月出 し	アラジン ラビッドイエロー ブルーヘブン シンデレラ ローズマリー	施設	10 条植 床幅 90～100cm 条間9cm 株間9cm 通路45cm													85,000 ～ 90,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	15 15 15	5 5			20 15 20	・ たい肥2t (同上)

作物名	作 型 その他	品 種 名	形態	栽植 様式	作 型 模 式 図												目標 収量 (本)	要素	基肥 (kg)	追肥(kg)(回)			要素 合計	備 考
					1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月				1	2	3		
グラジオラス	7～9月 出し	ヘッター トラベラー ファイヤーブランド トパーズ	露地	2条植 条間5cm 株間5cm 通路60cm				×									28,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	10～15 15～20 10～15	5 5			15～20 15～20 15～20	・たい肥2t (同上)
トリカブト		ビカラー アーリー・ブルー イースト・ブルー スカイ・ブルー	露地	5条植 床幅100cm 条間20cm 株間20cm 通路60cm													18,000 ～ 48,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	15 15 15	5 5			20 15 20	・追肥は生育に より施用する。
ストック	秋出し	高波系 クリスマス系	施設	7条植 床幅85cm 条間12cm 株間12cm 通路60cm													30,000 ～ 40,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	15～20 15～20 15～20	10 10 10			25～30 25～30 25～30	
トルコギキョウ	春出し	あずまシリーズ	施設	7条植 床幅85cm 条間12cm 株間12cm 通路60cm												×	30,000 ～ 40,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	10～12 10～12 10～12	2 2 2	2 2 2	2 2 2	16～18 16～18 16～18	・たい肥2t (同上) ・固定種は20% 増施する。
デルフィニウム	春出し	ラベンダー スカイブルー スカイホワイト プリンセスカロライン	施設	条間30cm 株間40cm 通路60cm													8,000 ～ 12,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	10～15 10～15 10～15	10 10 10			20～25 20～25 20～25	・追肥は一番花 終了後施用す る。
チドリソウ	春出し	ピンク ライラック ホワイト	施設	4条植 床幅120cm 条間30cm 株間30cm 通路60cm													30,000 ～ 48,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	10～12 10～12 10～12				10～12 10～12 10～12	
レンギョウ	促成	ニホンレンギョウ チョウセンレンギョウ	露地	畦幅 150～180 cm 株間90cm				×									11,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	10 15 10				10 15 10	
ヤナギ類		アカメヤナギ クロメヤナギ ウンリュウヤナギ コリヤナギ セッカヤナギ	露地	畦幅 150～180 cm 株間 45～60cm				①									16,000 8,000 25,000 9,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	9 6 7	3 3 3			12 9 10	

作物名	作 型 その他	品 種 名	形 態	栽 植 様 式	作 型 模 式 図												目 標 収 量 (本)	要素	基肥 (kg)	追肥(kg)(回)			要素 合計	備 考
					1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月				1	2	3		
ツツジ	促成	ベニキリシマ タナシツツジ ヒノデキリシマ	露地	畦幅 80～90cm 株間 45～60cm	入室, 促成 ✕ ←												16,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	20 15 13	5 5			25 15 18	・たい肥2t (同上)
ソケイ		キソケイ ヒマラヤソケイ	露地	畦幅 100～120 cm 株間 60～90cm	✕ 2～3年 株養成												18,000 ～ 20,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	20 22 20				20 22 20	
エニシダ		セッカエニシダ キバナエニシダ	露地	畦幅90cm 株間45cm	✕												10,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	20 12 12				20 12 12	
サクラ	促成	ヒガンザクラ ケイオウザクラ	露地	畦幅 200～250 cm 株間	入室, 促成 ✕												15,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	10 10 10	6 8 6			16 18 16	
ヒバ類		シノブヒバ ヒムロスギ	露地	6条植 床幅90cm 条間20cm 株間18cm	①												20,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	5.6 6.3 5.6	2.4 2.7 2.4			8 9 8	・たい肥2t (同上)
		クジャクヒバ	露地	畦幅 30～40cm 株間 20～30cm	✕ 3～4年 養成												5,400							
ユキヤナギ	促成	蒲田早生 大和 岡山生	露地	畦幅 120～150 cm 株間 30～50cm	入室, 促成 ✕ ① さし木苗から2～3年 養成 ←												16,000 ～ 20,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	10 10 10	4 6 8			14 16 18	・たい肥3t (同上)
サングミズキ		在来種 コーラルビューティー	露地	畦幅100cm 株間50cm	① ✕ さし木苗から2～3年 養成												26,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	15 12 12	10 5 5			25 17 17	・3年以降収穫 ・萌芽前に追肥
トサミズキ ヒュウガミズキ	促成	在来種	露地	畦幅150cm 株間 90～100cm	入室, 促成 ✕ ① 3～4年生苗を3～4年養成 ←												13,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	15 12 12	10 5 5			25 17 17	・たい肥3～5t (同上) ・萌芽前に追肥

作物名	作 型 その他	品 種 名	形態	栽 植 様 式	作 型 模 式 図												目標 収量 (本)	要素	基肥 (kg)	追肥(kg)(回)			要素 合計	備 考
					1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月				1	2	3		
ハナモモ	促成	矢口 寒白	露地	畦幅350cm 株間250cm													18,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	5 5 5	1			6 5 5	
フィリガクアジサイ	促成	在来種	露地	畦幅120cm 株間30cm													30,000 ～ 40,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	7 8 7				7 8 7	・3年目以降収穫。 ・たい肥3～5t(同上) ・萌芽前に追肥。
アナベル	雨よけ栽培・露地季咲栽培(平坦地・中間高冷地)		施設	畦幅150cm 株間100～30cm													24,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O 中間地 N P ₂ O ₅ K ₂ O	0～5 0～5 0～5 0～5 0～5 0～5				0～5 0～5 0～5 0～10 0～10 0～10	・追肥は生育を見て「中間高冷地の浮石れき土壌」のみ行う。 ・植付時：たい肥1～2t(同上)
ミナヅキ	雨よけ栽培(平坦地・中間高冷地)		施設	畝幅150cm 株間100～30cm													12,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O 中間地 N P ₂ O ₅ K ₂ O	0～5 0～5 0～5 5～9 5～9 5～9				0～5 0～5 0～5 5～14 5～14 5～14	・追肥は生育を見て「中間高冷地の浮石れき土壌」のみ行う。 ・植付時：たい肥1～2t(同上)
カシワバアジサイ	雨よけ栽培(平坦地)	八重カシワバアジサイ カシワバアジサイ	施設	畦幅150cm 株間100cm													8,400	N P ₂ O ₅ K ₂ O	0～3 0～3 0～3	0-5 0-5 0-5			0～8 0～8 0～8	・春基肥：化成 ・採花後：(生育に応じ) たい肥1t＋化成(同上)
キンバコデマリ	促成	在来種	露地	畦幅120cm 株間30cm (2本挿)													17,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	10 4 4				10 4 4	・1年目無施肥 ・2年目以降施肥 ・鶏糞200～250kg(同上)
サンシュユ	促成	在来種	露地	畦幅200cm 株間50cm													12,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	10 8 8				10 8 8	・たい肥1～2t(同上)

作物名	作 型 その他	品 種 名	形 態	栽植 様式	作 型 模 式 図												目 標 収 量 (本)	要素	基肥 (kg)	追肥(kg) (回)			要素 合計	備 考
					1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月				1	2	3		
シンビジウム (切花)	季咲出し	グリーンサワー ロマンス クリスタル マイフェアレディ エリザベス ピードモント	施設	ベンチ150cm 通路70cm 7号 6,000鉢 /1,000㎡	2 ～ 3 年 株 養 成												10,000 ～ 14,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O		1 ～ 3 回		4回	22.2 13.8 13.8	・ 開花株7号(暮 れ咲品種)6,000 鉢/1,000㎡当た り施用量。
					①												④			6 3.6 3.6		4.2 3 3		
					②												③ 細霧 冷房							
オンシジウム (切花)	季咲出し	イエローハード グララムゼ	施設	ベンチ150cm 通路70cm 3号 25,000鉢 /1,000㎡	2 ～ 3 年 株 養 成												23,000 ～ 25,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	4～6 4～6 4～6	1～2			5～8 5～8 5～8	・ 開花株 3 号 25,000鉢/1,000 ㎡ 当たり 施 用 量。
					① 遮光												1～2 1～2 1～2							
ファレノプシス	季咲出し	白花系 桃花系	施設	ベンチ150cm 通路70cm 4号 22,000鉢 /1,000㎡	2 ～ 3 年 株 養 成												22,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	5～6 5～6 5～6	1～2			6～8 6～8 6～8	・ 開花株 4 号 22,000鉢/1,000 ㎡ 当たり 施 用 量。
					① 遮光												1～2 1～2 1～2							
ハイドランジア (鉢物)	4～5月出 し	ミセスクミコ ブルーダイヤモンド	施設	5～7号鉢	さし木 鉢上げピンチ												5,000 ～ 6,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	0.5 0.5 0.5				0.5 0.5 0.5	・ 用土 1 ℓ 当た り追肥は、育苗 期窒素成分75～ 150ppmで週1～2 回施用。促成期 は赤系で窒素成 分75～150ppm、 青系で窒素成分 50～500ppmで各 週1回施用する。
					鉢替 え																			
シクラメン (鉢物)	11～12月 出し	スカーレット系 サーモンピンク系 ホワイト系	施設	5～7号鉢	鉢替 え 鉢替 え 鉢替 え												5,000 ～ 6,000	N P ₂ O ₅ K ₂ O	0.3 0.3 0.3				0.3 0.3 0.3	・ 追肥は栄養診 断値に応じて行 う。
					鉢替 え 鉢替 え 鉢替 え																			